Наименование ТВП: Пойма Щары

© С. Левый

Код: BY055

Географические координаты: 52°46.57' N 25°47.56

Административная принадлежность: Брестская область: Ивацевичский район, Ляховичский район

Площадь: 2594 га

Критерии: A1

Национальный природоохранный статус: Паўднёвая частка Ландшафтны заказнік рэспубліканскага значэння «Выганашчанскае»

Международный природоохранный статус: ТВП міжнароднай значнасці

Общее описание:

ТВП "Пойма Шчары" утворана ў 2012 г. Знаходзіцца ў 3 км на поўнач ад воз. Выганашчанскае. Паўднёвая частка ТВП уваходзіць у склад ландшафтнага заказніка рэспубліканскага значэння “Выганашчанскае”.

Тэрыторыя ТВП уключае поплавы р. Шчара, а таксама меліарыраванныя угодзі, якія слаба выкарыстоўваюцца. Рака Шчара не каналізавана, захавалася ў натуральным стане. У межах ТВП працягласць ракі больш за 20 км. Рэчышча звілістае, шырынёй да 20 м. Берагі нізкія, пераважна тарфяністыя. Праз Агінскі

канал злучаеца з воз. Выганашчанскае. Акрамя таго, Агінскі канал праз Шчару і Ясельду злучае басейны Балтыцкага і Чорнага мораў.

Менавіта поймавыя адчыненыя лугі Шчары, захаваўшыяся ў натуральным стане, з’яўляюцца найбольш каштоўнымі біятопамі гэтай ТВП, як месца гнездавання глабальна пагражаемага віду вяртлявай чаротаукі *Acrocephalus paludicola* і месца харчавання яшчэ аднаго глабальна пагражаемага віду - вялікага арляца *Aquila clanga*. Вяртлявая чаротаўка таксама адзначана ў значнай колькасці і на меліярыраванных участках, парослых асокамі.

У межах ТВП адсутнічаюць населеныя пункты, дарожная сетка не развіта. Тэрыторыя выкарыстоўваецца галоўным чынам для сенакашэння на меліярыраванных землях, палявання, рыбнай лоўлі, радзей для турызма.

Основные биотопы:

Натуральная рачная пойма з адчыненымі поплавамі і трысняговымі зараснікамі - 70%, сельгасугоддзі на меліярыраваных землях - 25%, іншае - 5%.

Птицы:

Склад птушак ТВП "Пойма Шчары" даследаван недастаткова. Аснову арнітафауны складаюць птушкі паплавоў, вадаплаваючыя і каляводныя віды. Падчас веснавой міграцыі на разлівах Шчары адзначаецца значная колькасць розных відаў качак, крычак і кулікоў. У тым ліку качка-лапаноска *Anas clypeata*, баталён *Philomachus pugnax*, кулік-случок *Tringa totanus*, чорная крычка *Chlidonias niger*, белакрылая крычка *Chlidonias leucopterus*, белашчокая крычка *Chlidonias hybrida* і інш.

Другие группы животных:

не даследавана.

Состояние редких видов птиц:

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды (2000-2011)	Критерий ТВП
Выпь большая *Botaurus stellaris*	гн	2 с	2010-2013	Т	↔	

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды (2000-2011)	Критерий ТВП
Подорлик большой *Aquila clanga*	зал	2 ос	2010-2013	П	↔	
Турухтан *Philomachus pugnax*	мг	200-400 ос	2013	П		
Камышовка вертлявая *Acrocephalus paludicola*	гн	36-40 с	2010	Т	↔	А1

Другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды:

не даследавана.

Угрозы:

1. **Зарастенне меліярыраванных земляў і поплаваў хмызнякамі.** На шматлікіх участках ТВП (як на меліярыраванных, так і натуральных) адзначаеца павелічэнне плошчы хмызнякоў. Гэты вядзе да знікнення месц гнездавання вяртлявай чаротаукі *Acrocephalus paludicola* і месц харчавання вялікага арляца *Aquila clanga*.
2. **Сенакашэнне у гнездавы перыяд.** Пры нізкімузроўне вады на меліярыраванных угоддзях праводзіцца сенакашэнне тэхнікай ў час калі яшчэ гняздзяцца многія віды птушак (у тым ліку і вяртлявая чаротаўка). Гэтая вядзе да гібелі птушанят і кладак.
3. **Нестабільнасць узроўню вады.**

Рекомендации по сохранению:

неабходна стварэнне плана кіравання ТВП.

Источники информации:

Блакітная кніга Беларусі (Водныя аб'екты Беларусі). Энцыклапедыя. Мінск, 1994.

Составители : Левы С.В.

---

* *Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org*